



IX JORNADAS SOBRE E.I.I. EN SEVILLA
(Enf. de Crohn y Colitis Ulcerosa)
Sevilla – 28 de noviembre del 2007



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN.



Dr. José López Pérez
Servicio Cirugía General y Digestiva II
Hospital Universitario Virgen Macarena
Sevilla



MARCO DE ACTUACIÓN DE LA CIRUGÍA

- Infección.
- Hemorragia.
- Obstrucción.
- Enfermedad no controlable.
- Presencia factores agravantes:
 - * Malnutrición.
 - * Trastorno de la inmunidad.
 - * Tratamientos prolongados.

CORTICOIDES INMUNOSUPRESORES

INFLIXIMAB-Otros son malos compañeros de viaje de la cirugía.

Además, otras entidades clínicas pueden acompañar, agravar y complicar resultados quirúrgicos:

- * PROLIFERACIONES BACTERIANAS:
 - DISBACTERIOSIS ABT.
 - GÉRMENES TERMODÚRICOS ?.

PARATUBERCULOSIS Y CROHN

La prevalencia del Crohn va en aumento en países industrializados y también la padecen los desplazados desde países sin esta enfermedad (factor ambiental).

La paratuberculosis es endémica también en las “cabañas” de los países industrializados y con la peculiaridad que causa parecidas

lesiones intestinales en animales, cuyos subproductos lácteos parecen no estar libres a pesar de la pasteurización de alta gama.

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA DE SEVILLA

Residencial Conde de Bustillo, 11 Local – 9 – 41005 – Sevilla Telf.: 954 639 407

CIF 41914599 - Nº REGISTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONES 6.713- MIEMBRO DE A.C.C.U. ESPAÑA --MIEMBRO DE LA F.A.M.S.-
REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES Nº 1.204 SUR - REGISTRO EN LA CONSEJERIA DE SALUD 608/01- MIEMBRO DE LA
E.F.C.C.A. (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES DE ENF. DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA)



IX JORNADAS SOBRE E.I.I. EN SEVILLA

(Enf. de Crohn y Colitis Ulcerosa)
Sevilla – 28 de noviembre del 2007



No está demostrada una relación causa-efecto, pero ¿podría paratuberculosis estar involucrada en los casos más “rebeldes” al tratamiento del Crohn?

¿Bomba de tiempo para el Crohn y para la industria lechera ?

¿Llegarán los microorganismos termodúricos a constituirse en emergencia infecciosa ?

MARCO DE ACTUACIÓN DE LA CIRUGÍA INFORMACIÓN PACIENTE-ENTORNO

- Proporcionada.
- Conocimientos de intervención :
 - RIESGOS (tabaco, obesidad, flebitis ...).
 - BENEFICIOS.
 - ALTERNATIVAS (ostomías...).
- Conocimientos de complicaciones postoperatorias, algunas condicionadas por tratamientos anteriores.
- Decreto de garantías del SAS.

SITUACIONES LÍMITES EN CROHN

INDICACIONES PARA ILEOSTOMÍA :

- * Síndrome compartimental asociado.
- * Sepsis abdominal no controlable con compromiso de órganos y funciones.
- * Enfermedad extensa ID – IG no controlable y que requiera cirugía del tramo intestinal ileocólico.
- * Paso previo de proctectomía.

VENTAJAS DE LA ILEOSTOMÍA

- Mejora enfermedad y % recurrencia.
- “La cirugía no es el paso final, es parte del cuidado del paciente”.
- Cirugía más sencilla y con menos complicaciones.
- Temporal / Permanente, tipo Brocke, la no evertida más complicaciones.

INCONVENIENTES DE LA ILEOSTOMÍA

- Requiere bolsa recolectora, con cambios periódicos y vaciar 4-6 veces / día.
- Prolapso-estenosis-retracción-erosión-dermitis-abrasión-sangrado-fistulas.
- Eliminarla requiere RIQ.
- “Los riesgos se sobrepasan por las expectativas de beneficio”.

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA DE SEVILLA

Residencial Conde de Bustillo, 11 Local – 9 – 41005 – Sevilla Telf.: 954 639 407

CIF 41914599 - Nº REGISTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONES 6.713- MIEMBRO DE A.C.C.U. ESPAÑA --MIEMBRO DE LA F.A.M.S.-
REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES Nº 1.204 SUR - REGISTRO EN LA CONSEJERIA DE SALUD 608/01- MIEMBRO DE LA
E.F.C.C.A. (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES DE ENF. DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA)



IX JORNADAS SOBRE E.I.I. EN SEVILLA
(Enf. de Crohn y Colitis Ulcerosa)
Sevilla – 28 de noviembre del 2007



INDICACIONES DE PROCTECTOMÍA :

- * Sepsis perianal grave refractaria a tratamiento.
 - * Estenosis rectal grave-microrrecto.
 - * Ulceraciones rectales progresivas.
 - * Incontinencia con gran destrucción de esfínteres.
 - * Displasia grave-neoplasia asociada.
- *** 30% quedarán con herida-sinus perineal persistente è + morbilidad.
- * La ILEOSTOMÍA es permanente.

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA DE SEVILLA

Residencial Conde de Bustillo, 11 Local – 9 – 41005 – Sevilla Telf.: 954 639 407

CIF 41914599 - Nº REGISTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONES 6.713- MIEMBRO DE A.C.C.U. ESPAÑA --MIEMBRO DE LA F.A.M.S.-
REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES Nº 1.204 SUR - REGISTRO EN LA CONSEJERIA DE SALUD 608/01- MIEMBRO DE LA
E.F.C.C.A. (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES DE ENF. DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA)